

Varotoimet ja eristysluokat infektiosairauksissa sairaalahoidon aikana					
Infektio/sairaus/mikrobi	Tavanomaiset varotoimet (TV)	Kosketusvarotoimet (KV)	Pisaraeristys (PV)	Ilmaeristys (IV)	Toimenpiteiden kesto, huomautuksia
<b>Absessi (runsaasti erittävä)</b>	X	X			KV kunnes runsas erityys loppuu
<b>Adenovirus pikkulapsilla</b>	X	X	X		KV & PV oireiden keston ajan
<b>Anthrax</b> - kliininen sairaus - altistuminen itiöitä sisältävälle jauheelle	X X	X		X	KV & IV kunnes ympäristö on puhdistettu jauheesta
<b>Atyyppiset mykobakteerit</b>	X				
<b>Clostridium difficile</b> - oireeton kolonisaatio - ripuli	X X	X			KV ripulin ajan ja 2 vrk ripulin loputtua
<b>CPE</b>	X	X			
<b>Creutzfeldt-Jakobin tauti</b>	X				
<b>Cytomegalovirus</b>	X				
<b>Difteria (kurkkumätä)</b> - ihomuoto - nielumuoto	X X	X	X		KV kunnes viljely negatiivinen PV kunnes viljely negatiivinen (kaksi vähintään 24 tunnin välein otettua viljelyä neg)
<b>Ebolavirus</b>	X	X	X	X	Eristys koko sairauden keston ajan
<b>Enterovirusinfektiot (Coxsackie-, Echo-virukset)</b> - aikuisilla - lapsilla	X X	X			KV oireiden keston ajan
<b>Epiglottiitti</b> (aiheuttajana <i>Haemophilus influenzae</i> )	X		X		PV 24 h tehoavan hoidon aloittamisesta
<b>ESBL-kannat</b> - Klebsiella pneumoniae - E.Coli ja muut bakteerit	X X	X			KV vain riskiosastoilla (veri- ja syöpätautiosastot)
<b>Furunkuloosi</b> (aiheuttajana stafylokokki) - pikkulapsilla	X	X			KV oireiden keston ajan
<b>Gastroenteriitti</b> (aiheuttajamikrobista riippumatta)	X	X			KV ripulin ajan ja 2 vrk ripulin loputtua, (käsihygieniä: ensin käsien saippuapesu ja sen jälkeen alkoholihuuhteen käyttö)
<b>Haavainfektio:</b> - runsaasti erittävä	X	X			KV kunnes runsas erityys loppuu
<b>Hepatiitti</b> - <i>A-hepatiitti</i> • aikuisilla • vaippaikäisillä tai inkontinenteilla  - <i>B-hepatiitti</i> - <i>C-hepatiitti</i> - <i>E-hepatiitti</i>	X X  X X X	X			KV alle 3-vuotiailla sairaalahoidon ajan, 3–14-vuotiailla 2 viikkoa, muilla 1 viikko oireiden alusta

Infektio/sairaus/mikrobi	Tavanomaiset varotoimet (TV)	Kosketusvarotoimet (KV)	Pisaraeristys (PE)	Ilmaeristys (IE)	Toimenpiteiden kesto, huomautuksia
<b>Herpes simplex</b> - enkefaliitti - mukokutaani, uusiutuva - mukokutaani, vaikea primaari tai yleistynyt - neonataali infektio	X X X X	X X			KV oireiden keston ajan KV oireiden keston ajan
<b>Herpes zoster (vyöruusu)</b> - paikallinen - paikallinen immuunipuutteisella - yleistynyt	X X X	X X X		X X	KV oireiden keston ajan KV & IV oireiden keston ajan KV & IV oireiden keston ajan
<b>Hinkuyskä (pertussis)</b>	X		X		PV 5 vrk tehokkaan hoidon aloittamisesta
<b>HIV</b>	X				
<b>Ihoinfektio</b> (runsaasti erittävää)	X	X			KV kunnes runsas erityys loppuu
<b>Impetigo (märkärupi)</b>	X	X			KV 24 h tehokkaan hoidon aloittamisesta
<b>Influenssa</b>	X		X		PV 5 vrk ajan
<b>Isorokko</b>	X	X	X	X	
<b>Lassakuume</b>	X	X	X	X	Eristys koko sairauden keston ajan
<b>Lintuinfluenssa</b>	X	X	X	X	Eristys koko sairauden keston ajan
<b>Marburgin tauti</b>	X	X	X	X	Eristys koko sairauden keston ajan
<b>Meningiitti</b> - aseptinen tai virus - meningokokki, tiedetty tai epäilty - Haemophilus influenzae tiedetty tai epäilty - muu bakteeri tai sieni	X X X X		X X		KV lapsilla enterovirusinfektioissa PV 24 h tehokkaan hoidon aloittamisesta PV 24 h tehokkaan hoidon aloittamisesta
<b>Meningokokkisepsis tai pneumonia</b>	X		X		PV 24 h tehokkaan hoidon aloittamisesta
<b>MERS</b>	X	X	X	X	Eristys koko sairauden keston ajan
<b>Metapneumovirus</b>	X		X		
<b>MRSA</b> - kantaja - sairaalassa altistunut - perhealtistuminen, jatkuva altistuminen	X X X	X X			KV kunnes seulontavastaukset valmiit. Tämän jälkeen tulosten mukaisesti.
<b>Mycoplasma pneumoniae</b>	X				
<b>Parainfluenssavirus</b>	X	X	X		KV oireiden keston ajan
<b>Parvorokko (parvovirus B 19 infektio)</b> - potilaalla aplastinen anemia tai immuunipuutos - muut potilaat	X X		X		PV aplastisessa anemiassa 7 vrk, immuunipuutteisilla sairaalahoitoaika
<b>Pemphigus neonatorum</b>	X	X			KV oireiden keston ajan
<b>Pneumonia, kun aiheuttaja</b> - adenovirus - klamydia - Haemophilus influenzae - meningokokki - mykoplasma - Pneumocystis jiroveci - pneumokokki - streptokokki, ryhmä A - muu bakteeri tai sieni - virus	X X X X X X X X X X	X	X X X		KV & PV oireiden keston ajan PV 24 h tehokkaan hoidon alusta PV 24 h tehokkaan hoidon alusta PV 24 h tehokkaan hoidon alusta

Infektio/sairaus/mikrobi	Tavanomaiset varotoimet (TV)	Kosketusvarotoimet (KV)	Pisaraeristys (PE)	Ilmaeristys (IE)	Toimenpiteiden kesto, huomautuksia
<b>Poliomyeliitti</b>	X	X			KV sairaalahoidon ajan
<b>Rabies</b> (vesikauhu, raivotauti)	X				
<b>Respiratorinen infektio</b> (akuutti, aiheuttajamikrobi tuntematon)	X	X	X		KV & PV oireiden keston ajan
<b>Ripuli</b> (äkillinen infektiöosi)	X	X			KV ripulin ajan ja 2 vrk ripulin loputtua
<b>RSV-infektio</b>	X	X	X		KV & PV oireiden keston ajan
<b>Rutto (<i>Yersinia pestis</i>)</b> - pneumoninen - imusolmukemuoto	X X		X		PV 72 h tehokkaan hoidon alusta
<b>Salmonellainfektiot</b>	X				
<b>SARS</b>	X	X	X	X	
<b>Sikotauti (parotiitti)</b>	X		X		PV 9 vrk sylkirauhasturvotuksen alusta
<b><i>Stafylococcus aureus</i>-infektio</b> - absessi, iho- tai haavainfektio, jos runsaasti erittävä - MRSA - muut	X X X	X  X			KV kunnes runsas erityis loppuu
<b><i>Streptococcus pyogenes</i> -infektio</b> - iho- tai haavainfektio, runsaasti erittävä - pneumonia, faryngiitti tai tulirosko - vakava invasiivinen	X X X	X	 X X		KV 24 h tehokkaan hoidon alusta PV 24 h tehokkaan hoidon alusta PV 24 h tehokkaan hoidon alusta
<b>Syfilis (kuppa, lues)</b>	X				
<b>Syyhy (scabies)</b>	X	X			KV 24 h tehokkaan hoidon alusta
<b>Tuberkuloosi</b> - ekstrapulmonaalinen, märkivä  - keuhko- tai kurkunpää-tuberkuloosi • yskösvärjäys positiivinen tai sellaiseksi epäilty • laajat tai onteloiset thx-muutokset, vaikka yskösvärjäys olisi negatiivinen  - muu tuberkuloosi (esim. meningiitti)	X  X  X				Oma huone, jossa saniteettitila, kunnes erityis on loppunut tai saatu 3 negatiivista viljelyä. (IV hoitotoimenpiteiden aikana, jos märkäeritteen aerosolisaatiota ei voida välttää)  IV:n kesto arvioidaan yksilöllisesti hoitovasteen perusteella <u>Lääkeherkkä Tb</u> : IV kunnes on saatu kolme peräkkäistä negatiivista yskösvärjäystä eikä epäillä lääkeresistenttiä tuberkuloosia <u>Lääkeresistentti Tb</u> : IV kunnes saatu kannan herkkyysmääritys ja kaksi viikon välein kerättyä yskösvärjäyssarjaa on vastattu negatiivisina
<b>Tuhkarokko (morbilli)</b>	X	X	X	X	IV oireiden keston ajan
<b>Tularemia (jänisrutto)</b>	X				
<b>Tulirosko</b>	X		X		PV 24 h tehokkaan hoidon alusta
<b>Täit (pedikuloosi)</b>	X	X			KV 24 h tehokkaan hoidon alusta
<b>Vesirokko (varicella)</b>	X	X		X	KV & IV kunnes leesiot rupeutuneet
<b>Vihurirosko (rubella)</b>	X		X		PV 7 vrk ihottuman alusta
<b>VRE</b>	X	X			