

Varoimet ja eristysluokat infektiosairauksissa sairaalahoiton aikana					
Infektio/sairaus/mikrobi	Tavanomaiset varoimet (TV)	Kosketus-varoimet (KV)	Pisara-varoimet (PV)	Ilma-eristys (IE)	Toimenpiteiden kesto, huomautuksia
<b>Absessi (runsaasti erittävä)</b>	X	X			KV kunnes runsas erityks loppuu
<b>Adenovirus pikkulapsilla</b>	X	X	X		KV & PE oireiden keston ajan
<b>Anthrax</b> – kliininen sairaus – altistuminen itiöitä sisältävälle jauheelle	X X	X		X	KV & IE kunnes ympäristö on puhdistettu jauheesta
<b>Atyyppiset mykobakteerit</b>	X				
<b>Clostridium difficile</b> – oireeton kolonisaatio – ripuli	X X	X			KV ripulin ajan ja 2 vrk ripulin loputtua
<b>CPE</b>	X	X			
<b>Creutzfeldt-Jakobin tauti</b>	X				
<b>Cytomegalovirus</b>	X				
<b>Difteria (kurkkumätä)</b> – ihomuoto – nielumuoto	X X	X	X		KV kunnes viljely negatiivinen PE kunnes viljely negatiivinen (kaksi vähintään 24 tunnin välein otettua viljelyä neg)
<b>Ebolavirus</b>	X	X	X	X	Eristys koko sairauden keston ajan
<b>Enterovirusinfektio (Coxsackie-, Echo-virukset)</b> – aikuisilla – lapsilla	X X	X			KV oireiden keston ajan
<b>Epiiglottiitti</b> (aiheuttajana <i>Haemophilus influenzae</i> )	X		X		PE 24 h tehoavan hoidon aloittamisesta
<b>ESBL-kannat</b> – Klebsiella pneumoniae – E.Coli ja muut bakteerit	X X	X			KV vain riskiasastoilla (veri- ja syöpätautiasotot)
<b>Furunkuloosi</b> (aiheuttajana stafylokokki) – pikkulapsilla	X	X			KV oireiden keston ajan
<b>Gastroenteriitti</b> (aiheuttajamikrobista riippumatta)	X	X			KV ripulin ajan ja 2 vrk ripulin loputtua, (käsihygieniä: ensin käsien saippuapesu ja sen jälkeen alkoholihiuhteen käyttö)
<b>Haavainfektio:</b> – runsaasti erittävä	X	X			KV kunnes runsas erityks loppuu
<b>Hepatiitti</b> – <i>A-hepatiitti</i> • aikuisilla • vaippaikäisillä tai inkontinenteilla – <i>B-hepatiitti</i> – <i>C-hepatiitti</i> – <i>E-hepatiitti</i>	X X X X X	X			KV alle 3-vuotiailla sairaalahoiton ajan, 3–14-vuotiailla 2 viikkoa, muilla 1 viikko oireiden alusta

Infektio/sairaus/mikrobi	Tavanomaiset varotoimet (TV)	Kosketusvarotoimet (KV)	Pisara-varotoimet (PV)	Ilmaeristys (IE)	Toimenpiteiden kesto, huomautuksia
<b>Herpes simplex</b> – enkefaliitti – mukokutaani, uusiutuva – mukokutaani, vaikea primaari tai yleistynyt – neonataali infektio	X X X X				KV oireiden keston ajan KV oireiden keston ajan
<b>Herpes zoster (vyöruusu)</b> – paikallinen immuunokompetentilla – paikallinen immuunipuutteisella – yleistynyt	X X X	X X X		X X	KV kunnes leesiot rupeutuneet KV kunnes leesiot rupeutuneet IE kunnes nähdään, ettei vyöruusu yleisty KV & IE kunnes leesiot rupeutuneet
<b>Hinkuuskä (pertussis)</b>	X		X		PE 5 vrk tehokkaan hoidon aloittamisesta
<b>HIV</b>	X				
<b>Ihoinfektio</b> (runsaasti erittävä)	X	X			KV kunnes runsas erityks loppuu
<b>Impetigo (märkäruipi)</b>	X	X			KV 24 h tehokkaan hoidon aloittamisesta
<b>Influenssa</b>	X		X		PE 5 vrk ajan
<b>Isorokko</b>	X	X	X	X	
<b>Lassakuume</b>	X	X	X	X	Eristys koko sairauden keston ajan
<b>Lintuinfluenssa</b>	X	X	X	X	Eristys koko sairauden keston ajan
<b>Marburgin tauti</b>	X	X	X	X	Eristys koko sairauden keston ajan
<b>Meningiitti</b> – aseptinen tai virus – meningokokki, tiedetty tai epäilty – Haemophilus influenzae tiedetty tai epäilty – muu bakteeri tai sieni	X X X X		X X		KV lapsilla enterovirusinfektioissa PE 24 h tehokkaan hoidon aloittamisesta PE 24 h tehokkaan hoidon aloittamisesta
<b>Meningokokkisepsis tai pneumonia</b>	X		X		PE 24 h tehokkaan hoidon aloittamisesta
<b>MERS</b>	X	X	X	X	Eristys koko sairauden keston ajan
<b>Metapneumovirus</b>	X		X		
<b>MRSA</b> – kantaja – altistunut	X X	X			
<b>Mycoplasma pneumoniae</b>	X				
<b>Parainfluenssavirus</b>	X	X	X		KV oireiden keston ajan
<b>Parvorokko (parvovirus B 19 infektio)</b> – potilaalla aplastinen anemia tai immuunipuutos – muut potilaat	X X		X		PE aplastisessa anemiassa 7 vrk, immuunipuutteisilla sairaalahoitoaika
<b>Pemphigus neonatorum</b>	X	X			KV oireiden keston ajan
<b>Pneumonia, kun aiheuttaja</b> – adenovirus – klamydia – Haemophilus influenzae – meningokokki – mykoplasma – Pneumocystis jiroveci – pneumokokki – streptokokki, ryhmä A – muu bakteeri tai sieni – virus	X X X X X X X X X X	X	X X X X		KV & PE oireiden keston ajan PE 24 h tehokkaan hoidon alusta PE 24 h tehokkaan hoidon alusta PE 24 h tehokkaan hoidon alusta

Infektio/sairaus/mikrobi	Tavanomaiset varotoimet (TV)	Kosketusvarotoimet (KV)	Pisaravaroitimet (PV)	Ilmaeristys (IE)	Toimenpiteiden kesto, huomautuksia
<b>Poliomyeliitti</b>	X	X			KV sairaalahoidon ajan
<b>Rabies</b> (vesikauhu, raivotauti)	X				
<b>Respiratorinen infektio</b> (akuutti, aiheuttajamikrobi tuntematon)	X		X		KV & PE oireiden keston ajan
<b>Ripuli</b> (äkillinen infektiöosi)	X	X			KV ripulin ajan ja 2 vrk ripulin loputtua
<b>RSV-infektio</b>	X	X	X		KV & PE oireiden keston ajan
<b>Rutto</b> ( <i>Yersinia pestis</i> )					
– pneumoninen	X		X		PE 72 h tehokkaan hoidon alusta
– imusolmukemuoto	X				
<b>Salmonellainfektiot</b>	X				
<b>SARS</b>	X	X	X	X	
<b>Sikotauti (parotitti)</b>	X		X		PE 9 vrk sylkirauhasturvotuksen alusta
<b>Stafylococcus aureus-infektio</b>					
– absessi, iho- tai haavainfektio, jos runsaasti erittävä	X	X			KV kunnes runsas erityis loppuu
– MRSA	X	X			
– muut	X				
<b>Streptococcus pyogenes -infektio</b>					
– iho- tai haavainfektio, runsaasti erittävä	X	X			KV 24 h tehokkaan hoidon alusta
– pneumonia, faryngiitti tai tulirokko	X		X		PE 24 h tehokkaan hoidon alusta
– vakava invasiivinen	X		X		PE 24 h tehokkaan hoidon alusta
<b>Syfiilis (kuppa, lues)</b>	X				
<b>Syyhy (scabies)</b>	X	X			KV 24 h tehokkaan hoidon alusta
<b>Tuberkuloosi</b>					
– ekstrapulmonaalinen, märkivä	X				Oma huone, jossa saniteettitila, kunnes erityis on loppunut tai saatu 3 negatiivista viljelyä. (IE hoitotoimenpiteiden aikana, jos märkäeritteen aerosolisaaatiota ei voida välttää)
– keuhko- tai kurkunpää-tuberkuloosi	X			X	IE:n kesto arvioidaan yksilöllisesti hoitovasteen perusteella <u>Lääkeherkkä Tb</u> : IE kunnes on saatu kolme peräkkäistä negatiivista yskösvärväystä eikä epäillä lääkeresistenttiä tuberkuloosia <u>Lääkeresistentti Tb</u> : IE kunnes saatu kannan herkkyysmäärittäminen ja kaksi viikon välein kerättyä yskösvärväyssarjaa on vastattu negatiivisina
• yskösvärväys positiivinen tai sellaiseksi epäilty					
• laajat tai onteloiset thx-muutokset, vaikka yskösvärväys olisi negatiivinen					
– muu tuberkuloosi (esim. meningiitti)	X				
<b>Tuhkarokko (morbilli)</b>	X		X	X	IE oireiden keston ajan
<b>Tularemia (jänisrutto)</b>	X				
<b>Tulirokko</b>	X		X		PE 24 h tehokkaan hoidon alusta
<b>Täit (pedikuloosi)</b>	X	X			KV 24 h tehokkaan hoidon alusta
<b>Vesirokko (varicella)</b>	X	X		X	KV & IE kunnes leesiot rupeutuneet
<b>Vihurirokko (rubella)</b>	X		X		PE 7 vrk ihottuman alusta
<b>VRE</b>	X	X			