

Päivitetty  
14.5.2020

## Eristyssivoustaulukko

Tätä ohjetta noudatetaan välisiivouksessa, päivittäisessä siivouksessa ja loppusiivouksessa.

Nocospray vetyperoksidikuivasumutin laitetta käytetään loppusiivouksen jälkeen erikseen mainituissa tapauksissa vuodeosastoilla.

Laitetta voidaan hyödyntää myös erilaisissa ongelmatilanteissa tai epidemiatilanteissa muissa yksiköissä.

Pääsääntöisesti siivouksessa käytetään mikrokuituista siivouspyyhettä. Kertakäyttöisiä siivouspyyhkeitä käytetään eritetahapoistossa ja kloorin kanssa. Siivousvälineet ovat huonekohtaiset ja ne puhdistetaan ja desinfioidaan käytön jälkeen.

| Eristys   | Suojaimet  | Pintojen puhdistaminen ja desinfektio  | Pyykki ja jätteet   | Huom!   |
|---|--|--|---|---|
| <p><b>1 Kosketusvarotoimet</b></p> <p><b>1a kosketusvarotoimet:</b></p> <p>MRSA, VRE, moniresistentti (MDR) Pseudomonas aeruginosa ja moniresistentti (MDR) Akinetobakteeri</p> <p><b>1b kosketusvarotoimet:</b></p> <p>Runsaasti erittävä haava- tai ihoinfektio</p> <p>Pikkulapsella hengitystieinfektiot, enterovirusinfektiot ja RSV-infektio</p> <p>Polio</p> <p>Parvorokko (immuunipuutteisilla)</p> <p>Suolistoinfektio: salmonella, shigelloosi, yersinia, hepatiitti A, EHEC</p> | <p>Kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina.</p> <p><i>Ellei pitkähihaista suojavaatetta ole saatavilla, voidaan sen sijaan käyttää hihatonta esiliinaa. Tällöin käsivarret on desinfiotava työasun hihaan asti suojaimia riisuttaessa.</i></p> <p>Kertakäyttöiset suojakäsineet.</p> <p>Kirurginen suu-nenäsuojus, kun on vaara eriteroiskeista.</p> <p><i>Ellei kirurgista suu-nenäsuojausta ole saatavilla, voit sen sijaan käyttää koko kasvot peittävää pitkää visiiriä.</i></p> | <p>Eritetahradesinfektio: Klorilli 1000 ppm tai Erisan Oxy+ 2 % ja kertakäyttöpyyhe.</p> <p>Kosketus- ja tasopinnot pyyhitään Erisan Oxy+ 2 % tai Klorilli 1000 ppm.</p> <p>Lattia pyyhitään yleispuhdistusaineella.</p> <p>Kosteaa menetelmä.</p> | <p>Pyykki ja jätteet pakataan tavallisiin pusseihin. Pussit suljetaan eristyshuoneessa tai salissa.</p> <p>Pussit voi pudottaa kuiruun.</p> | <p><b>Huom! Toistaiseksi ei vetyperoksidikuivasumuteta!</b></p> <p><b>1a:</b> Huone vetyperoksidikuivasumutetaan (Nocospray) loppusiivouksen jälkeen, jos potilaalla on ollut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MRSA,</li> <li>• VRE,</li> <li>• moniresistentti Pseudomonas aeruginosa</li> <li>• moniresistentti Akinetobakteeri</li> </ul> <p><b>1b:</b> Muissa tapauksissa huoneen voi ottaa käyttöön heti siivouksen jälkeen.</p> |

Päivitetty  
14.5.2020

| Eristys  | Suojaimet   | Pintojen puhdistaminen ja desinfektio   | Pyykki ja jätteet   | Huom!  |
|--|---|---|---|--|
| <p><b>2</b> <b>Kosketusvarotoimet</b></p> <p>ESBL-Klebsiella</p>   | <p>Kertakäyttöinen suojatakki tai hi-hallinen suojaesiliina.<br/><i>Ellei pitkähahaista suojavaatetta ole saatavilla, voidaan sen sijaan käyttää hiha-tonta esiliinaa. Tällöin käsivarret on desinfioitava työasun hihaan asti suojaimia riisuttaessa.</i></p> <p>Kertakäyttöiset suojakäsineet.</p> <p>Kirurginen suu-nenäsuojus, kun on vaara eriteroiskeista.<br/><i>Ellei kirurgista suu-nenäsuojainta ole saatavilla, voit sen sijaan käyttää koko kasvot peittävää pitkää visiiriä.</i></p> | <p>Eritetahradesinfektio:<br/>Klorilli 1000 ppm tai Erisan Oxy+ 2 % ja kertakäyttöpyyhe.</p> <p>Kosketus- ja tasopinnot pyyhitään Erisan Oxy+ 2 % tai Klorilli 1000 ppm.</p> <p>Lattia pyyhitään yleispuhdistusaineella.</p> <p>Kostea menetelmä.</p>   | <p>Pyykki ja jätteet pakataan tavallisiin pusseihin. Pussit suljetaan eristyshuoneessa tai salissa.</p> <p>Pussit voi pudottaa kuiluun.</p>   | <p>Loppusiivouksessa WC-istuimen huuhtelureunan alapuolelle valutetaan reunoja myöten 4 dl laimentamatonta klooria. Kloorin annetaan vaikuttaa 60 minuuttia, jonka jälkeen pestään harjalla ja huuhdellaan. Käytä lisäksi silmäsuojaimia.</p> <p><b>Huom! Toistaiseksi ei vetyperoksidikuivasumuteta!</b></p> <p>Loppusiivouksen jälkeen tyhjä huone vetyperoksidikuivasumutetaan (Nocospray).</p> |
| <p><b>3</b> <b>Kosketusvarotoimet</b></p> <p>Karbapenemaasia tuottavat gramnegatiiviset sauvabakteerit (CPE)</p> | <p>Kertakäyttöinen suojatakki tai hi-hallinen suojaesiliina.</p> <p>Kertakäyttöiset suojakäsineet.</p> <p>Kirurginen suu-nenäsuojus aina potilashuoneessa.</p>  | <p>Eritetahradesinfektio:<br/>Klorilli 1000 ppm tai Erisan Oxy+ 2 % ja kertakäyttöpyyhe.</p> <p>Kosketus- ja tasopinnot pyyhitään Erisan Oxy+ 2 % tai Klorilli 1000 ppm.</p> <p>Eristyksen aikana lattia pyyhitään yleispuhdistusaineella.</p> <p>Loppusiivous lattia pyyhitään Klorilli 1000 ppm tai Erisan Oxy+ 2 %.</p> <p>Kostea menetelmä.</p> | <p>Pyykki ja jätteet pakataan ja pussit suljetaan eristys-huoneessa tai salissa.</p> <p>Pyykki pakataan liukenevaan pyykkipussiin, joka laitetaan keltaiseen pussiin.</p> <p>Pyykki käsitellään tartuntavaarallisena.</p> <p>Pyykki- ja jättepusseja ei saa pudottaa kuiluun. Tee sähköinen tilaus kuljetusyksikölle osastolta noutamista varten.</p> | <p>Loppusiivouksessa WC-istuimen huuhtelureunan alapuolelle valutetaan reunoja myöten 4 dl laimentamatonta klooria. Kloorin annetaan vaikuttaa 60 minuuttia, jonka jälkeen pestään harjalla ja huuhdellaan. Käytä lisäksi silmäsuojaimia.</p> <p><b>Huom! Toistaiseksi ei vetyperoksidikuivasumuteta!</b></p> <p>Loppusiivouksen jälkeen tyhjä huone vetyperoksidikuivasumutetaan (Nocospray)</p>  |

Päivitetty  
14.5.2020

| Eristys   | Suojaimet   | Pintojen puhdistaminen ja desinfektio  | Pyykki ja jätteet   | Huom!  |
|---|---|--|---|--|
| <p><b>4 Kosketusvarotoimet</b></p> <p><b>4a Kosketusvarotoimet</b><br/>Täit, syyhy, kihomadot</p> <p><b>4b Kosketusvarotoimet</b><br/>Lutikat</p> | <p>Kertakäyttöinen suojatakki tai hi-hallinen suojaesiliina.</p> <p>Kertakäyttöiset suojakäsineet.</p> <p>Kirurginen suu-nenäsuojus, kun on vaara eriteroiskeista.<br/><i>Ellei kirurgista suu-nenäsuojainta ole saatavilla, voit sen sijaan käyttää koko kasvot peittävää pitkää visiiriä.</i></p> | <p><b>4a:</b> Siivotaan normaalisti. Mikrokitupyyhkeet pakataan liukenevaan pyykkipussiin, joka laitetaan keltaiseen pyykkipussiin. Pyykkipussin päälle kirjoitetaan täi, syyhy tai kihomadot.</p> <p><b>4b:</b> Käytetään kertakäyttöisiä siivouspyyhkeitä. Muuten siivotaan normaalisti.</p> | <p>Pyykki ja jätteet pakataan ja pusit suljetaan eristyshuoneessa tai salissa.</p> <p>Pyykki pakataan liukenevaan pyykkipussiin, joka laitetaan keltaiseen pyykkipussiin. Pyykkipussin päälle kirjoitetaan täi, syyhy tai lutikka.</p> <p>Jätteet pakataan muovipussiin, joka suljetaan ja laitetaan punaiseen muovisäkkiin.</p> <p>Pyykki- ja jätepusseja ei saa pudottaa kuiluun. Tee sähköinen tilaus kuljetusyksikölle osastolta noutamista varten.</p> | <p>Tilan voi ottaa käyttöön heti siivouksen jälkeen.</p> |


Päivitetty  
14.5.2020

| Eristys   | Suojaimet   | Pintojen puhdistaminen ja desinfektio  | Pyykki ja jätteet  | Huom!  |
|---|---|--|--|--|
| <p><b>5 Kosketusvarotoimet</b></p> <p>Äkillisesti alkaneet ripulioksennustaudit, esim Noroviruksen tai Clostridium difficile aiheuttama ripuli</p>  | <p>Kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina.</p> <p>Kertakäyttöiset suojakäsineet.</p> <p>Kirurginen suu-nenäsuojus aina potilashuoneessa.</p> <p>Kädet pestään huoneesta poistuttaessa ja eritetahradesinfektion jälkeen. Käsien pesun jälkeen kädet desinfioidaan.</p>   | <p>Eritetahradesinfektio: Klorilli 1000 ppm tai Erisan Oxy+ 2 % ja kertakäyttöpyyhe.</p> <p>Kosketus- ja tasopinnot pyyhitään Erisan Oxy+ 2 % tai Klorilli 1000 ppm.</p> <p>Lattia pyyhitään yleispuhdistusaineella.</p> <p>Kosteaa menetelmä.</p> | <p>Pyykki ja jätteet pakataan ja pussit suljetaan eristyshuoneessa tai salissa.</p> <p>Pyykki pakataan liukenevaan pyykkipussiin, joka laitetaan keltaiseen pussiin.</p> <p>Pyykki- ja jättepusseja ei saa pudottaa kuiluun. Tee sähköinen tilaus kuljetusyksikölle osastolta noutamista varten.</p> | <p>Loppusiivouksen jälkeen tyhjä huone vetyperoksidikuivausmutetaan (Nocospray).</p> <p>Huoneen voi ottaa käyttöön Nocospray -käsitteilyn jälkeen.</p> |
| <p><b>6 Pesaravarotoimet</b></p> <p>Influenssa</p> <p>Heaemophilus influenزان aiheuttama ylähengitystieinfektio tai meningiitti</p> <p>Kurkkumätä</p> <p>Hinkuyskä</p> <p>Meningokokin aiheuttama sepsis, pneumonia tai meningiitti (24 t lääkehoidon alusta)</p> <p>Vihurirokko</p> <p>Sikotauti</p> | <p>Kirurginen suu-nenäsuojus aina kun ollaan alle kahden metrin päässä potilaasta.</p> <p>Jos potilas yskii, aivastelee tai on limainen, käytetään lisäksi seuraavia suojaimia, kun ollaan alle kahden metrin päässä potilaasta:</p> <p>Visiiri tai suojalasit (<i>monikäyttöiset, puhdistusta käytön jälkeen</i>)</p> <p>Pitkähihainen suojatakki tai hihallinen esiliina</p> <p><i>Ellei pitkähihaista suojavaatetta ole saatavilla, voidaan sen sijaan käyttää hiha-tonta esiliinaa. Tällöin käsivarret on desinfiointava työasun hihaan asti suojaimia riisuttaessa.</i></p> <p>Suojakäsineet</p> | <p>Eritetahradesinfektio: Klorilli 1000 ppm tai Erisan Oxy+ 2 % ja kertakäyttöpyyhe.</p> <p>Kosketus- ja tasopinnot pyyhitään Erisan Oxy+ 2 % tai Klorilli 1000 ppm.</p> <p>Lattia pyyhitään yleispuhdistusaineella.</p> <p>Kosteaa menetelmä.</p> | <p>Pyykki ja jätteet pakataan tavalliseen pussiin. Pussit suljetaan eristyshuoneessa tai salissa.</p> <p>Pussit voi pudottaa kuiluun.</p>  | <p>Tilan voi ottaa käyttöön heti siivouksen jälkeen.</p>   |

Päivitetty  
14.5.2020

| Eristys  | Suojaimet  | Pintojen puhdistaminen ja desinfektio  | Pyykki ja jätteet  | Huom!  |
|--|--|--|--|--|
| <p><b>7</b> <b>Ilmaeristys ja kosketusvaroitoimet</b></p> <p>Vesirokko<br/>Yleistynyt vyöruusu<br/>Tuhkarokko</p>  | <p>FFP3-hengityksensuojain.<br/>Kertakäyttöiset suojakäsineet.<br/>Kertakäyttöinen suojatakki tai hi-hallinen suojaesiliina.<br/><i>Ellei pitkähäistä suojavaatetta ole saatavilla, voidaan sen sijaan käyttää hiha-tonta esiliinaa. Tällöin käsivarret on desinfioitava työasun hihaan asti suojaimia riisuttaessa.</i></p> | <p>Eritetahradesinfektio: Klorilli 1000 ppm tai Erisan Oxy+ 2 % ja kertakäyttöpyyhe.<br/>Kosketus- ja tasopinnat pyyhitään Erisan Oxy+ 2 % Klorilli 1000 ppm.<br/>Lattia pyyhitään yleispuhdistusaineella.<br/>Kostea menetelmä.</p> | <p>Pyykki ja jätteet pakataan tavallisiin pusseihin ja pussit suljetaan eristyshuoneessa tai salissa.<br/>Pussit voi pudottaa kuiluun.</p> | <p>Hengityksensuojain riisutaan vasta huoneen ulkopuolella.<br/><b>Huom! Toistaiseksi ei vetyperoksidikuivasumuteta!</b><br/>Loppusiivouksen jälkeen tyhjä huone vetyperoksidikuivasumutetaan (Nocospray).<br/>Huoneen voi siivota heti potilaan kotiutumisen jälkeen. Seuraavan potilaan voi ottaa huoneeseen kun edellisen kotiutumisesta on kulunut 2 tuntia.</p> |
| <p><b>8</b> <b>Ilmaeristys</b></p> <p>Värjäyspositiivinen keuhkotuberkuloosi tai kurkunpääntuberkuloosi<br/>Moniresistentti (MDR ja XDR) keuhkotuberkuloosi tai kurkunpääntuberkuloosi</p> | <p>FFP3 -hengityksensuojain.<br/>Kertakäyttöiset suojakäsineet.</p>  | <p>Eritetahradesinfektio: Klorilli 1000 ppm tai Erisan Oxy+ 2 % ja kertakäyttöpyyhe.<br/>Kosketus- ja tasopinnat sekä lattia pyyhitään yleispuhdistusaineella.<br/>Kostea menetelmä.</p>   | <p>Pyykki ja jätteet pakataan tavallisiin pusseihin ja pussit suljetaan eristyshuoneessa tai salissa.<br/>Pussit voi pudottaa kuiluun.</p> | <p>Hengityksensuojain riisutaan vasta huoneen ulkopuolella.<br/>Huoneen voi siivota heti potilaan kotiutumisen jälkeen. Seuraavan potilaan voi ottaa huoneeseen kun edellisen kotiutumisesta on kulunut 2 tuntia.</p>  |

Päivitetty  
14.5.2020

| Eristys  | Suojaimet   | Pintojen puhdistaminen ja desinfektio   | Pyykki ja jätteet  | Huom!   |
|--|---|---|--|---|
| <p></p> <p><b>Koronavirus COVID - 19</b></p> <p>Pisara- ja kosketusvarotoimet</p> | <p><b>KIRURGINEN SUU-NENÄSUOJAIN</b></p> <p><b>VISIIRI TAI SUOJALASIT</b> (<i>monikäyttöiset, puhdista käytön jälkeen</i>)</p> <p><b>SUOJATAKKI TAI HIHALLINEN ESILIINA</b></p> <p><i>Ellei pitkähihaista suojavaatetta ole saatavilla, voidaan sen sijaan käyttää hihatonta esiliinaa.</i></p> <p><i>Tällöin käsivarret on desinfioitava työasun hihaan asti suojaimia riisuttaessa.</i></p> <p><b>SUOJAKÄSINEET</b></p> <p>Valvonta- ja tehohoidon potilashuoneita siivotessa käytetään FFP2/3 -hengityksensuojainta (mahdollinen aerosolin muodostuminen hoitotoimissa). Tyhjän valvonta- ja tehohoidon potilashuoneen voi siivota ilman hengityksensuojainta yhden tunnin varoajan jälkeen.</p> | <p>Eritetahradesinfektio: Klorilli 1000 ppm tai Erisan Oxy+ 2 % ja kertakäyttöpyyhe.</p> <p>Kosketus- ja tasopinnat pyyhitään Erisan Oxy+ 2 % tai klorilli 1000 ppm.</p> <p>Lattia pyyhitään yleispuhdistusaineella.</p> <p>Kostea menetelmä.</p> | <p><b>Potilaspyykki</b> pakataan liukenevaan pyykkipussiin, joka laitetaan keltaiseen pussiin. Pyykkiä ei saa pudottaa kuiluun.</p> <p><b>Siivousmikrokuidut</b> Tays erillinen ohje</p> <p><b>Jätteet</b> pakataan tavallisiin pusseihin. Pussit suljetaan eristyshuoneessa tai salissa. Pussit voi pudottaa kuiluun.</p> | <p>Siivouksessa käytetään mikro-kuitupyyhkeitä.</p> <p>Potilashuoneet siivotaan kerran päivässä.</p> <p>Osaston muut tilat siivotaan tavanomaiseen tapaan.</p> <p>Jos potilaalle on tehty aerosolia tuottavia toimenpiteitä tavallisella vuodeosastolla tai poliklinikalla, pidetään tunnin varoaika ennen siivouksen aloittamista.</p> <p>Tyhjän potilashuoneen siivouksessa pään suojaimia ei tarvita, suojatakki (tai vast.) ja käsiineet riittävät.</p> <p>Vetyperoksidikuivasumutusta (Nocospray) ei tehdä.</p> <p>Tilan voi ottaa käyttöön heti siivouksen jälkeen.</p> |