

Valtakunnalliset ja alueelliset tuberkuloosin tartunnanjäljitysohjeet ovat muuttuneet  
*Infektiolääkäri Kirsi Valve, Tays*

THL on julkaissut uuden [suosituksen tuberkuloosin tartunnanjäljityksestä](#) (Ohjaus 29/2017). Suositukseen tehtyjen muutosten tavoite on keskittää jäljitysoimet niihin altistuneisiin henkilöihin, joilla on suurin riski saada tuberkuloositartunta ja sairastua tuberkuloosiin eli sairastuneen lähipiiriin.

Tärkeimpiä muutoksia ovat:

- tartuttavan keuhkotuberkuloosin määrittely on muutettu
  - o tartunnanjäljitys tehdään kaikissa keuhkotuberkuloositapauksissa ja keuhkojen ulkopuoleisissa tuberkuloosissa, jos värjäyspositiivisesta märkäeritteestä on muodostunut aerosolia
- altistumiset jaotellaan suuren (värjäyspositiivinen hengitysteiden tuberkuloosi tai thx-kuvassa ontelo) ja pienen tartuntariskin (värjäysnegatiivinen hengitysteiden tuberkuloosi) tilanteisiin
- työntekijöiden altistumisissa kiinnitetään erityisesti huomiota suuren tartuntariskin tilanteissa ilman hengityksensuojaimia tehtyihin riskitoimenpiteisiin
- yhteenlasketun altistuksen raja on nostettu kahdeksasta tunnista 40 tuntiin (paitsi alle 7-vuotiaat suuren tartuntariskin tilanteissa)
- 7–16-vuotiaat tutkitaan perusterveydenhuollossa

Salmonella riskiyössä -ohje on muuttunut  
*Infektiolääkäri Kirsi Valve, Tays*

THL on julkaissut päivitetyn [toimenpideohjeen salmonellatartuntojen torjumiseksi](#)

Uusittu salmonella-ohje täsmentää riskityötä tekevien terveydentilaselvitysten tarvetta salmonellatartunnan suhteen ja ohjeistaa laborato-

- IGRA-testaus laajennetaan alle 35-vuotiaisiin ja tartunnan saaneille harkitaan latentin tuberkuloosi-infektion hoitoa
- keuhkokuva seuranta järjestetään vain osalle altistuneista

Suosituksessa korostetaan tuberkuloosi-informaation antamista altistuneelle. Alkutarvaksessa (ja mahdollisten seurantakäyntien yhteydessä) annetaan tietoa tuberkuloosin oireista ja ohjeistetaan hakeutumaan viiveettä tutkimuksiin, jos näitä ilmaantuu.

Tuberkuloosi-informaatiota:

- [www.tuberkuloosi.fi](http://www.tuberkuloosi.fi)
- [Filhan usealle kielelle käännetty tuberkuloosiohje](#)

Pirkanmaan alueelliset toimintaohjeet on nyt myös päivitetty. [Tuberkuloosin tartunnanjäljitysohje](#) ohjeistaa sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon toimijoita. Tuberkuloosin tartunnanjäljitys koskee erityisesti kuntien tartuntatautivastuuhenkilöitä ja työterveyshuoltoa, joiden tulisi perehtyä uuteen suositukseen. Tuberkuloosille altistuneita seurataan tartuntatautilain 1227/2016 39§ perusteella ja sitä varten on laadittu eri tilanteisiin ja ikäryhmille omia seurantalomakkeita. Linkit lomakkeisiin löytyvät edellä mainitusta PSHP:n [Tuberkuloosin tartunnanjäljitysohjeesta](#).

riotutkimuksista. Tutkimusta ei enää pyydetä oireettomilta riskityötä tekevilta työntekijöiltä ulkomaanmatkan jälkeen. Työskentelyä vastasyntyneiden osastolla ei enää luokitella riskityöksi.

[PSHP:n salmonellaohje on myös päivitetty.](#)