

## COVID-näytteenottokriteerit laajenevat

*Infektioyksikkö, Tays*

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen [ohjeiden](#) mukaisesti COVID-näyte otetaan aiempaa matalammalla kynnyksellä 16.4.2020 alkaen.

1. Näyte otetaan **kaikista akuuttiin hengitystieinfektioon\*** sairastuneista henkilöistä:

- jotka ovat oireidensa vuoksi ottaneet yhteyttä terveyspalveluihin puhelimitse
- jotka ovat oireidensa vuoksi hakeutuneet päivystysvastaanotolle tai sairaalaan
- jotka ovat sairastuneet asuessaan hoito- tai hoivayksikössä
- joiden oireet ovat alkaneet osastohoidon (sairaalan tai terveyskeskussairaalan vuodeosasto) aikana, ellei syy ole ilmeinen (esimerkiksi influenssa, bakteeripneumonia tai aspiraatio)
- jotka ovat sairastuneet COVID-infektioon altistumisen vuoksi määrätyn karranteen aikana.

### Erityisesti korostetaan seuraavien ryhmien tutkimista:

- Oireiset terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijät

- Oireettoman terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijän oireinen lähipiiri
- Oireiset synnyttäjät
- Oireiset iäkkäät henkilöt (yli 70-vuotiaat) ja vakavan koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat henkilöt

2. Näyte otetaan myös henkilöistä, joiden **oirekuva herättää lääkärin perustellun epäilyn COVID-19-infektiosta**

- vakava taudinkuva tai happeutumishäiriö
- joillakin sairastuneista on myös suolisto-oireita (pahoinvointi, ripuli, vatsakipu). Joskus ripuli voi olla ensimmäinen oire infektiosta

3. Jos sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä (sairaalat, terveyskeskusten vuodeosasto, pitkäaikaishoidon ja hoivan toimintayksiköt) todetaan koronavirustartunta

- konsultoi Taysin infektioyksikköä ja tiedota kunnan tartuntatautivastaualäkäriä
- epidemian laajuuden selvittämiseksi harkitaan kaikkien altistuneiden tutkimista

#### \*COVID-infektion aiheuttaman hengitystieinfektion oirekuva on vaihteleva

Influenssan kaltainen taudinkuva:

- kuiva yskä, kurkkukipu, lämpöily /kuume, hengenahdistus, lihaskivut, päänsärky, väsymys

Lievä ylähengitystieinfektio:

- lievimmillään vain kurkun karheutta
- kurkkukipu ja/tai nuha
- haju- ja makuaistin menetys on vahvasti COVID-infektioon viittaava oire, se voi esiintyä yksinään tai liittyä muihin oireisiin

Alahengitystieinfektio (keuhkokuume):

- lämpöily / kuume, yskä, rintakipu, hengenahdistus, voimakas väsymys