



HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPUURI



Uutta seksitaudeista

Eija Hiltunen-Back
Dosentti, iho- ja sukupuolitautilien
erikoislääkäri
HUS



HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPUURI



www.kaypahoito.fi/ Seksitaudit

-päivitys 2018



Seksitautien epidemiologiaa

- Tartuntataudit Suomessa 2017/THL:
<http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-148-5>
- Tippuri lisääntyy, lähes 600 tapausta
- Etenkin nuorilla aikuisilla, oireettomuus yleistä
- Klamydiatartuntoja > 14 000
- Puolet tippuri- ja kuppataartunnoista saadaan Suomessa

Haastattelussa selvitettävät asiat:

- oireet (seksitautien itämisajat)
- potilaan oma käsitys tartunta-ajankohdasta ja -riskistä sekä tartunnan yhteydestä mahdollisten oireiden alkamiseen
- kondomin käyttö
- naisilla raskauden ehkäisy
- seksitapa: heteroseksii, miesten välinen seksi, mahdollinen altistuminen suuseksin välityksellä
- tartuntamaa
- tieto jäljitettävästä taudista ja tartunta-ajankohta, jos potilas tulee seksikumppanin tai terveydenhuoltohenkilöstön lähettämänä
- huumeiden pistoskäyttö
- aiemmat HPV-, hepatiitti A- ja hepatiitti B- rokotukset



Seksitautit

Käypä hoito 2018

Tauti	Aikaisin luotettava näytteenotto-ajankohta	Tarkistusnäytteen ajankohta, jos ensimmäinen näyte negatiivinen	Diagnostiset testit	Lääkärin ilmoitusvelvollisuus
Klamydia	5 vrk		U-ChtrNhO ChtrNhO U- CtGcNhO CtGcNhO	ei
Tippuri	5 vrk		U- CtGcNhO CtGcNhO GcVi	kyllä
Kuppa	3–4 viikkoa	1,5 kuukautta	S-TrpaAb (tai S-KardAb + S-TPHA)	kyllä
HIV-infektio	3–4 viikkoa	3 kuukautta	S-HIVAgAb	kyllä
Oireinen HSV-infektio			HSVVi HSVPVi HSVNhO	ei
Hepatiitti B	3–4 viikkoa	3–4 kuukautta	S-HBsAg	kyllä
Hepatiitti C	3–8 viikkoa	3–6 kuukautta	S-HCVAb	kyllä



HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPUOLUSTUS

tauti	mikrobilääke	annos	hoitoaika
Klamydia	atsitromysiini tai doksisykliini (myös ekstragenitaalisen infektion)	1 g 100 mg x2	kerta-annos 7 vrk
Tippuri	<ul style="list-style-type: none"> • viljelynäyte ennen hoidon aloitusta!! • herkkyysmäärityksen mukaan • jos kanta ei tiedossa, keftriaksoni + atsitromysiini 	500 mg im 2 g	kerta-annos kerta-annos

Uusien tartuntojen ehkäisy ja jälkitarkastus

- Klamydian ja tippurin hoidon yhteydessä huolehditaan uusien tartuntojen ehkäisemisestä:
 - seksistä tulee pidättyä viikon ajan
 - kondomia tulee käyttää negatiiviseen jälkitarkastusvastaukseen asti.
- Jälkitarkastus (4 vkoa hoidosta):
 - jälkitarkastusnäytteet otetaan niistä paikoista, joissa tartunta todettiin ja tutkitaan nukleinihapon osoitustestillä.
 - varmistetaan, että tartunnan lähde ja muut tartunnan saaneet on hoidettu
 - annetaan ohjeet turvaseksistä ja raskaudenehkäisystä
 - varmistetaan, että muut seksitaudit on luotettavasti suljettu



Taaksepäin kartoitettavat ajanjaksot

Käypä hoito 2018

Tauti	Selvitettävä aika
Yleisvaarallinen tauti	
Kuppa	1. Primaarikuppa: oireiden kesto + 2 kuukautta 2. Sekundaarikuppa: oireiden kesto + 2 kuukautta 3. Latentti kuppa: 2 vuotta
Valvottavat taudit	
Tippuri	1. Oireinen: oireiden kesto + 2 viikkoa 2. Oireeton: 6 kuukautta
Klamydia	1. Oireinen: oireiden kesto + 4 viikkoa 2. Oireeton: 6 kuukautta
LGV	1. Oireinen: 6 kuukautta 2. Oireeton: 6 kuukautta
HIV	Nykyhetkestä todennäköiseen tartuntahetkeen tai viimeisimpään negatiiviseen HIV-testitulokseen

Genitaalierpeksen hoitosuositus

Lääke	Primaari-infektio	Uusintaepisodi	Estohoito
Asikloviiri	200 mg × 5/5-10 vrk 400 mg × 3/5-10 vrk	200 mg × 5/5 vrk 400 mg × 3/5 vrk 800 mg × 3/2 vrk	400 mg × 2
Valasikloviiri	500 mg × 2/5-10 vrk	500 mg × 2 3-5 vrk	500 mg × 1
Famsikloviiri	250 mg × 3/5-10 vrk	125 mg × 2 5 vrk / 1000 mg × 2 1 vrk	250 mg × 2



Kondylooman kotihoito

- Imikimodi; Aldara
- Podofyllotoksiini; Condyline, Condylox, Warticon
- Määräaikainen erityislupa



Mycoplasma genitalium-infektio

- epäselvän uretriitin/servisiitin selvittelyssä
- jos klamydia- ja tippurinäytteet negatiiviset

- azithromycin 500 mg 1.vrk, 250 mg x1 2–5. vrk
- toissijainen Moxifloxacin 400 mg x1 7 vrk
- Maksullinen resepti
- Hoidon jälkeinen näyte
- Vakituksen kumppanin testaus ja hoito



Lymphogranuloma venereum

- *C. trachomatis* serotyypit L1-3
- Proktiitti
- Miesten välinen seksi
- Rektumin CtrNhO+, jos LGV-epäily; CtJtNhO
- Doksisykliini 100mg x 2 21 vrk
- Tartuntatauti-ilmoitus
- Jälkitarkastus 4 vko